

1-800-9021-00

BIOFARMA NATURAL CMD, S.A. DE C.V.

Industria Hulera Núm.97, Fracc. Industrial Zapopan Norte, 45130, Zapopan, Jal., México
 Tel.: 01 (33) 3833-5537 con 6 líneas
 Fax: 01 (33) 3833-5637
 www.comercializadordcmd.com; www.cmd.com.mx



MAXIBILOBA

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Cada COMPRIMIDO contiene:	= 1 tablet
Ácido glutámico	250.00 mg
Extracto seco de las hojas de Ginkgo biloba (Ginkgo)	40.00 mg
Fosfato de calcio dibásico dihidratado (equivalente a 28 mg de calcio)	120.24 mg
Ácido ascórbico (vitamina C)	20.00 mg
Sulfato de zinc monohidratado (equivalente a 5 mg de zinc)	13.73 mg
Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6)	0.533 mg
Riboflavina (vitamina B2)	0.340 mg
Mononitrato de tiamina (vitamina B1)	0.450 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)	0.533 mcg
Excipiente, c.b.p.	1 comprimido

IMAGEN



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Auxiliar en los síntomas como son: la disminución de la capacidad de atención y concentración, como aporte de las deficiencias de vitaminas y minerales.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, hemorragia cerebral reciente, hemorragia uterina, hemorragia aguda, infarto de miocardio en evolución, hipertensión arterial grave. Pacientes en tratamiento con anticoagulantes.

PRECAUCIONES GENERALES

No se administre más de la dosis recomendada.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se use en el embarazo y lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Muy rara vez pueden presentarse molestias gastrointestinales y dolor de cabeza.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Se advierte que hay que emplearlo con cuidado cuando se estén tomando anticoagulantes, incluido el ácido acetilsalicílico o si se tienen problemas de coagulación. Debe tenerse en cuenta que el extracto de Ginkgo puede potenciar el efecto anticoagulante del acenocumarol y warfarina, y el antiagregante plaquetario del ácido acetilsalicílico. No se debe administrar en personas epilépticas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido 2 veces al día, se recomienda el tratamiento durante 30 días, descansar 1 mes y en caso necesario repetir el tratamiento y/o consultar a su médico.
 Vía de administración: Oral.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

No se han reportado casos de sobredosificación o de la ingesta accidental, en caso de presentarse suspenda el producto y consulte a su médico.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Reg. Núm. 022P2004, SSA VI

JPR04363102472/R2004

Hecho en México por:

BIOFARMA NATURAL CMD, S. A. de C. V.

®Marca registrada

ADVERTENCIAS

Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30°C.
 No se deje al alcance de los niños.
 Si persisten las molestias, consulte a su médico.
 El frasco contiene un desecante no ingerible, consérvese dentro del envase.

NOTA IMPORTANTE

USO PEDIÁTRICO:

Este tratamiento terapéutico no es recomendado para niños.