

| Supplement Facts - Informations nutritionnelles - Informaciones nutricionales                                                                                                                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Serving size: 2 tablets - Servings per container: 15<br>Dose journalière : 2 comprimés - Nombre de doses par boîte : 15<br>Dosis diaria: 2 comprimidos - Cantidad de dosis por envase: 15                                                | Serving size<br>Dose journalière<br>Dosis diaria |
| Vit. B3 (35 mg inositol hexanicotinate + 30 mg niacinamide ascorbate)<br>Vit. B3 (35 mg inositol hexa nicotinate + 30 mg ascorbate de niacinamide)<br>Vit. B3 (35 mg inositol hexanicotinato + 30 mg ascorbato de niacinamida) . . . . . | 130 mg                                           |
| Choline bitartrate - Bitartrate de choline - Bitartrato de colina . . . . .                                                                                                                                                              | 100 mg                                           |
| Flavinmononucleotide (coenzymated vit. B2) - (vit. B2 coenzymée)<br>Flavinmononucleótido (vitamina B2 coenzimada) . . . . .                                                                                                              | 100 mg                                           |
| D calcium pantothenate (vitamin B5) - D calcium panthothénate (vit. B5)<br>D calcio pantotenato (vitamina B5) . . . . .                                                                                                                  | 80 mg                                            |
| Pyridoxal-5-phosphate (coenzymated vitamin B6) - Pyridoxal-5-phosphate<br>(vitamine B6 coenzymée) - Piridoxal-5-fosfate (vitamina B6 coenzimada) . . . . .                                                                               | 60 mg                                            |
| Cocarboxylase (coenzymated vit. B1) - Cocarboxylase (vit. B1 coenzymée)<br>Cocarboxilasa (vitamina B1 coenzimada) . . . . .                                                                                                              | 50 mg                                            |
| Benfotamine (liposoluble derivative of vitamin B1) - (dérivé liposoluble de la<br>vitamine B1) - Benfotamina (derivado liposoluble de la vitamina B1) . . . . .                                                                          | 50 mg                                            |
| Nicotinamide adenine dinucleotide - Nicotinamide adénine dinucléotide<br>Nicotinamida adenine dinucleótido (NADH) . . . . .                                                                                                              | 13,2 mg                                          |
| Biotin (vitamin B8) - Biotine (vitamine B8) - Biotina (vitamina B8) . . . . .                                                                                                                                                            | 10 mg*                                           |
| Dibencozide (coenzymated vit. B12) - Dibencozide (vit. B12 coenzymée)<br>Dibencozido (vitamina B12 coenzimada) . . . . .                                                                                                                 | 1 mg                                             |
| Methylcobalamine (specific form of vitamin B12) - Méthylcobalamine (forme<br>spécifique de vit. B12) - Metilcobalamina (forma específica de vitamina B12) . . . . .                                                                      | 1 mg                                             |
| Folinic acid (from 0.648 mg calcium folinate) - Acide folinique (de 0,648 mg<br>de folinate de calcium) - Ácido folínico (de 0,648 mg de calcio folinato) . . . . .                                                                      | 0,6 mg                                           |

\*RDA in Biotin: 20,000%. - \*AJR en Biotine: 20 000 %. \*CDR en Biotina: 20 000%.  
**Other ingredients:** acacia gum, sorbitol, essential mint oil, sucralose.  
**Autres ingrédients :** gomme d'acacia, sorbitol, huile essentielle de menthe, sucralose.  
**Otros ingredientes:** goma de acacia, sorbitol, aceite esencial de menta, sucralosa.

**Conseil d'utilisation :** Adultes. Prendre 1 à 2 comprimés par jour. Placer le comprimé sous la langue et le laisser se dissoudre doucement. **Précautions :** Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Ce produit est un supplément nutritionnel qui ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants. Conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Comme avec tout supplément nutritionnel, consultez un professionnel de santé avant de le consommer si vous êtes enceinte, allaitez ou si vous avez un problème de santé.  
 Manufactured in the EU and distributed by: Fabricqué en UE et distribué par : Fabricado en UE y distribuido por: SN Worldwide Unipessoal, Lda,  
 Avenida Do Infante 66, Edifício Quinta Avenida 1<sup>o</sup>C, Funchal 9000-015, Portugal.



# COENZYMATED B FORMULA

## Provides the Full Range of B Vitamins

### Dietary Supplement

30

Sublingual Tablets

**Recommended use:** Adults. Take 1 to 2 tablets a day. Place tablet under the tongue and allow to dissolve slowly. **Precautions:** Do not exceed the recommended daily dose. This product is a nutritional supplement and should not replace a varied, balanced diet. Keep out of childrens' reach. Store away from direct light, heat and humidity. As with any nutritional supplement, you should consult a health professional before taking this product if you are pregnant, breastfeeding or have a health problem.

**Consejos de utilización:** Adultos. Tomar 1 a 2 comprimidos al día. Colocar el comprimido bajo la lengua y dejar disolverse lentamente. **Precauciones:** No superar la dosis diaria recomendada. Este producto es un complemento nutricional que no debe reemplazar a una dieta variada y equilibrada. No dejar al alcance de los niños pequeños. Conservar en un lugar frío y seco, alejado de la luz. Desaconsejado a las mujeres embarazadas o en lactancia. Consulte a un profesional de la salud antes de tomarlo si usted toma otros medicamentos.